



Gimondo Sebastián Anibal
DISEÑADOR GRAFICO
(5411) 46249009 / 15.35068494
gimondodiseno@hotmail.com.ar

trabajo: Etiq. NEORAM 37.5 WG _ 1Kilo
tamaño: 465mm ancho x300mm alto
fecha: 10/5/18



PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- UTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES: Mezclar el producto al aire libre, usando antiparras, guantes y ropa protectora de manga larga. No pulverizar en días ventosos. Evitar la inhalación de la neblina y el contacto con la piel. El equipo de pulverización debe enjuagarse con agua, luego de cada aplicación. Después del trabajo, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto del producto.

RIESGOS AMBIENTALES:

Ligeramente tóxico para aves.
Ligeramente tóxico para peces: No contaminar fuentes de agua.
Virtualmente no tóxico para abejas.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN: Si el contenido de este envase es usado parcialmente, el remanente debe ser guardado en su envase herméticamente cerrado y almacenado en un depósito en lugar aislado y a resguardo de factores climáticos. Los restos de producto o del enjuague de las máquinas pulverizadoras pueden ser aplicados sobre el cultivo. De lo contrario, colocar el remanente en tambores en un área segura y enviarlos a una planta de tratamiento.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACÍOS: Verificar que las bolsas estén totalmente vacías. Inutilizarlas por perforación, para evitar su reutilización. Colocar en recipientes adecuados y posteriormente eliminarlos mediante empresas habilitadas a tal fin. Seguir normas locales, asegurando no contaminar el ambiente.

ALMACENAMIENTO: Almacenar siempre en los envases originales. No almacenar junto con productos para alimentación humana o animal. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No dejar a la intemperie ni expuesto a temperaturas superiores a los 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.

DERRAMES: Asilar el área y denegar la entrada. Utilizar equipo de protección personal. No tocar el material derramado. Detener la pérdida si puede hacerse en forma segura. Recoger el derrame mediante barrido y colocar dentro de recipientes para su posterior disposición. Recurra a empresas especializadas en disposición final de residuos peligrosos. Ventilar los espacios cerrados.

PRIMEROS AUXILIOS: **Inhalación:** Trasladar a zona ventilada inmediatamente. Asistir con respiración artificial si fuera necesario. Mantener la persona afectada abrigada y en reposo. Solicitar atención médica inmediatamente. **Piel:** Quitar la ropa y los zapatos contaminados por el producto. Lavar el área de la piel afectada, con jabón y gran cantidad de agua, hasta que no se evidencie la presencia del producto. **Ojos:** Lavar con abundante cantidad de agua al menos durante 15 minutos. **Ingestión:** no administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas. Si el vómito se produce naturalmente, mantener a la persona afectada sentada e inclinada hacia delante. Llamar de inmediato al médico. En todos los casos procurar asistencia médica y mostrar el envase con la etiqueta del producto.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO: Producto ligeramente peligroso (Clase III) Irritación dérmica: Leve irritante dérmica (CUIDADO) Categoría IV. Irritación ocular: Leve irritante ocular (CUIDADO) Categoría IV. Aplicar tratamiento para productos a base de cobre. Grupo químico: Inorgánico.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA: Sabor metálico, dolor en la boca y estómago, diarrea, estimulación de nervios centrales seguido de depresión, en casos severos convulsiones, parálisis o coma.

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

-Unidad Toxicológica del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez.
Tel. (011) 4962-6666 y 4962-2247
-Sección Toxicológica del Hospital de Clínicas de Buenos Aires.
Tel. (011) 5950-8804/06 int. 480
-Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico A. Posadas.
Tel. (011) 4654-6648 y 4658-7777
-Hospital de Niños de Córdoba. Tel. (0351) 4233303/4229961
-TAS – Toxicología, Asesoramiento y Servicio (0341) 424-2727

FUNGICIDA
GRUPO M1

Neoram®

37.5 WG

GRÁNULOS DISPERSABLES

Composición:

Oxiclورو de cobre.....	63 g.*
Humectantes e inertes c.s.p.....	100 g.

* Equivalente a 37,5 g. de cobre metálico.

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO
INSCRIPTO EN EL SENASA CON EL N° 35.284

Origen: Italia

No Inflamable

Fecha de vencimiento: Ver envase

Lote N°: Ver envase

Importante

ISAGRO SpA produce el fungicida NEORAM 37.5 WG elaborado según rigurosas normas de calidad internacional. Siendo su aplicación afectada por los usuarios sin intervención de la Empresa, en condiciones y medios variables, AGRI STAR SA no asume ninguna responsabilidad por el uso y empleo del producto, distintos a los aquí indicados.



Titular y Fabricante:
ISAGRO S.p.A. - Centro Uffici San Siro
Via Caldera 21 - 20153 Milano / Italy
Tel.:+39 02 40901.1 www.isagro.com



Registra, Importa y Distribuye:
Magallanes 2195 – B1836AVM
Llavallol – Pcia. de Buenos Aires
Tel/Fax: (011) 4231-2052/0172
info@agristar.com.ar / www.agristar.com.ar
© Es marca registrada por Isagro SpA.

GENERALIDADES: NEORAM 37.5 WG es un fungicida a base de oxiclورو de cobre formulado como gránulos dispersables, indicado para la prevención de enfermedades criptogámicas en los cultivos mencionados en la tabla de recomendaciones de uso.

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: cargar la máquina pulverizadora con agua hasta la mitad de su capacidad, verter la dosis indicada, manteniendo los agitadores en funcionamiento. Efectuar un completo mojado del vegetal, hasta punto de goteo, logrando una cobertura de 50-70 gotas/cm² de superficie foliar, a fin de asegurar un mejor control.

Equipos y técnicas de aplicación: Pulverizadores, manuales o a motor, provistas de agitadores mecánicos o hidráulicos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS g/100 l de agua	EPOCA DE APLICACIÓN
CÍTRICOS	Sarna (<i>Sphaceloma fawcetti</i>)	350-425	1ra. Antes de floración, cuando aparecen los primeros botones florales. 2da. Después de floración. 3ra. A la caída de las ¼ partes de los pétalos.
	Cancrosis de los cítrus (<i>Xanthomonas campestres pv. citri</i>)		1ra. Antes de floración. 2da. A la caída de los pétalos. 3ra. Cuando el fruto tenga 1 a 2 cm. de diámetro. 4ta. y siguientes, después de 40-50 días.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)		1ra. Antes de floración. 2da. Después de floración. 3ra. A los 20-30 días de la 2da.
	Melanosis (<i>Phomopsis citri</i>)		1ra. Recién formado el fruto. 2da. A los 20-30 días.
	Fumagina (<i>Capnodium citri</i>)	350	1ra. A los 30 días de fecundada la flor. 2da. 20 días después. Controlar pulgones y cochinillas que favorecen el desarrollo de la enfermedad.
	Mancha grisienta (<i>Mycosphaerella citri</i>)	275-315	En diciembre-enero y repetir en febrero-marzo.
DURAZNERO ALMENDRO DAMASCO	Mal de la munición (<i>Stigmina carpophila</i>)	475-715	Después de la brotación, cuando se desarrollan los pétalos. Repetir después de la caída del cáliz. En Otoño poco antes de la caída de las hojas
		425-475	Al hincharse las yemas y después de la floración.
	Torque del duraznero (<i>Taphrina deformans</i>)	275-350	1ra. Al hincharse las yemas. 2da. A principios de floración. No aplicar en plena floración pues el duraznero es sensible a los cúspicos.

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS g/100 l de agua	EPOCA DE APLICACIÓN
CIRUELO CEREZO	Mal de la munición (<i>Stigmina carpophila</i>)	475-715	Después de la brotación, cuando se desarrollan los pétalos. Repetir después de la caída del cáliz. En Otoño poco antes de la caída de las hojas
		425-475	Al hincharse las yemas y después de la floración.
VID	Peronospora o mildiu (<i>Plasmopara viticola</i>) Antracnosis (<i>Sphaceloma ampelina</i>)	350-425	1ra. Cuando los brotes midan 8 y 10 cm. de largo. Repetir cada 15 a 20 días. Suspender durante la floración y continuar hasta que la uva se ponga píntona.
FRUTILLA	Viruela (<i>Mycosphaerella fragariae</i>) Tizón o mancha de la hoja (<i>Dendrophoma obscurans</i>)	350-425	Aplicar antes de la floración, cuando las plantas son pequeñas y comienza el desarrollo de las primeras hojas. Repetir cada 15-20 días.
OLIVO	Mancha ocular (<i>Cycloconium oleaginum</i>)	425	Aplicar luego de la fecundación de las flores. Repetir cada 15 días.
TOMATE	Tizón o mildiu (<i>Phytophthora capsica</i>)	350-425	Inicio en almácigo, repitiendo cada 7-10 días, hasta que desaparezca la amenaza de enfermedad.
	Viruela o septoriosis (<i>Septoria lycopersici</i>)		1ra. En almácigo, con las primeras hojas. 2da. 10 días después de trasplante. Repetir cada 20 días según las condiciones ambientales y sobre fruto verde.
PAPA	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	425-560	Aplicar desde que la planta tenga 10-20 cm. de altura. Repetir después de cada lluvia. Mojar bien el vegetal. Recorrerlo periódicamente.
PIMIENTO	Viruela (<i>Cercospora capsica</i>)	350-425	Aplicar cada 15-20 días, desde que aparecen las hojas.
APIO	Viruela o septoriosis (<i>Septoria api graveolentis</i>)	350-425	Aplicar en almácigo, después del trasplante y repetir cada 20 días. Suspender en floración.
ARVEJA	Antracnosis (<i>Ascochita pisi</i>)	350-425 425-560	1ra. Al brotar las plantas. 2da. Con plantas de 20-30 cm de altura. Repetir cada 20 días.
	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	350-425 425-560	1ra. En plantas de 15-20 días de nacidas. Repetir cada 15-20 días hasta antes de floración y sobre fruto verde.
HABA	Roya (<i>Uromyces viciae-fabae</i>)	350-425 425-560	1ra. Al brotar las plantas. 2da. Con plantas de 20-30 cm de altura. Repetir cada 20 días.
REMO- LACHA ACELGA	Viruela (<i>Cercospora beticola</i>)	560	1ra. Al aparecer los cotiledones. 2da. Después del trasplante. Repetir cada 10 días.
FLORALES	Viruela del clavel (<i>Septoria dianthi</i>)	350-425	En los tratamientos preventivos desde que las plantas desarrollan sus primeras hojas o desde que los gajos han arraigado, repitiéndose cada 15-20 días antes de la floración.
	Viruela de la violeta (<i>Cercospora violae</i>)		
	Viruela del crisantemo (<i>Septoria leucanthemi</i>)		

RESTRICCIONES DE USO: Entre la última aplicación y la cosecha deben transcurrir los siguientes periodos: arveja, haba, papa, poroto, remolacha (raíz): 7 días. Acelga, almendro, apio, cítricos, frutales de carozo, remolacha (hoja), frutilla, olivo, pimiento, tomate, vid: 14 días. Florales: Exento

Tiempo de reingreso al área tratada: 24 horas después de aplicado el producto

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Las mezclas deben prepararse separadamente y verterlas juntas al tanque de la máquina. No mezclar con dinitroresoles ni con productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No fitotóxico siguiendo las recomendaciones de uso.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO



CUIDADO

